

FICHA TÉCNICA

FenEx Aguasol

USO VETERINARIO



1. GENERALIDADES:

Nombre Comercial: Fenex Aguasol

Clase de uso: Antiparasitario interno de amplio espectro con hierro.

Forma farmacéutica: Suspensión Oral

Composición química:

Fenbendazol 100mg

Citrato de hierro 10 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Suspensión líquida viscosa

Color: ligeramente anaranjado

pH: 3.0 - 7.0 (20 - 25 °C)

Densidad: 1.05 - 1.20 g/mL (20-25°C)

Estabilidad en almacén: estable durante 2 años a partir de su elaboración, bajo condiciones normales de almacenamiento.

3. DESCRIPCIÓN:

FENEX AQUASOL es un antiparasitario oral de amplio espectro de gran eficacia contra los nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias.

4. INDICACIONES:

FENEX AQUASOL está indicado para el tratamiento y control de los nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias del ganado vacuno, equino, ovino, caprino, camélidos sudamericanos y perros. Posee gran poder ovicida y puede ser administrado en animales de cualquier edad, hembras gestantes y animales altamente parasitados.

En rumiantes elimina *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.*, *Toxocara vitulorum spp.*, *Chabertia ovina*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Nematodirus lamae*, *Spiculoptera peruviana*, *Trichuris spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Moniezia spp.*, etc. Asimismo es altamente eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobióticas) de *Ostertagia spp.* resistentes.

En equinos elimina *Strongyloides westeri*, *Strongylus spp.*, *Parascaris equorum*, *Trichostrongylus axei*, *Triodontophorus tenuicollis*, *Oxyuris equi*, *Anaplocephala spp.*

En perros elimina *Toxocara spp.*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Taenia pisiformis*, etc.

Además, la combinación con citrato de hierro estimula en el animal parasitado la síntesis de vitamina B12, esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas. Previene anemias, mejora el nivel

5. ADMINISTRACIÓN:

FENEX AQUASOL se administra por vía oral.

6. DOSIS:

Vacunos, Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos:

Nemátodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL de FENEX AQUASOL por cada 20 Kg de peso corporal (equivalente a 5mg de Fenbendazol/Kg de P.V)

Larvas inhibidas (Hipobióticas) de *Ostertagia spp.*: 1.5 mL de FENEX AQUASOL por cada 20 Kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de Fenbendazol/Kg de P.V)

Tenias: 2 mL de FENEX AQUASOL por cada 20 Kg de peso corporal (equivalente a 10 mg de fenbendazol/Kg de P.V)

Administrar antes y después de las lluvias. En entos de engorde administrar antes del inicio del ciclo de engorde.

Tabla de dosificación:

ESPECIE ANIMAL	NEMATODES GI Y PULMONARES	TENIAS	TIPO DE TRATAMIENTO
Bovinos	1 mL / 20 Kg P.V	1 mL / 10Kg P.V	1 día
Ovinos y caprinos	1 mL / 20 Kg P.V	-	3 días junto con alimento
Cam. sudamericanos	1 mL / 10 Kg P.V	-	3-5 días
Porcinos	1 mL / 10 Kg P.V (Ascaris summi)	-	1 día
	1 mL / 20 Kg P.V (Otros)	-	1 día
Equinos	1 mL / 10 Kg P.V (Otros)	-	5 días
	1 mL / 10 Kg P.V (Oxyuris Equi)	-	1 día
Aves	1 mL / 2 Kg P.V (Ascaris sp.)	-	1 día (repetir cada 10 días)
	1 mL / 2 Kg P.V (Otros)	-	3-5 días
Caninos	1 mL / 2 Kg P.V		3 días
Felinos	1 mL / 2 Kg P.V		10 días

7. MODO DE ACCIÓN:

Los benzimidazoles (Fenbendazole), inhiben la polimerización de los microtúbulos al unirse a la tubulina (proteína estructural), lo que puede relacionarse con la inhibición conjunta de la acetilcolinesterasa del parásito. Inhiben los mecanismos de asimilación de la glucosa por parte del nemátodo, la producción ATP y la utilización del glucógeno. También inhiben los procesos oxidativos de fosforilación, que afecta la energía del parásito. Reduce la fumarato reductasa, lo que inhibe a su vez la generación de energía a nivel de mitocondrias.

8. PRECAUCIONES:

- En rumiantes se recomienda administrar el producto antes de la ingesta de las pasturas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

9. CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

10. PERIODO DE RETIRO:

Carne: 12 días

11. ALMACENAMIENTO:

- Mantener cerrado el envase una vez abierto el mismo.
- Guárdese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

12. PRESENTACIÓN:

Sachet 40 mL, Frascos de 250 mL, 500 mL, 1L y Galonera de 4L.

13. FORMULADOR / DISTRIBUIDOR:

AGP SAC / VETEX PERU SAC

14. REG. SENASA:

F.08.02.N.1150