

FICHA TÉCNICA

RafoGan

USO VETERINARIO



1. GENERALIDADES:

Nombre Comercial: RafoGan

Clase de uso: Antiparasitario Interno

Forma farmacéutica: Suspensión Oral

Composición química:

Rafoxanide..... 10,0 g

Fenbendazol 10,0 g

Cobalto 1 g

Selenio 0,50 mg

Excipientes 100 mL

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Suspensión

Color: rosado claro

Densidad: 1,00 - 1,15 g / mL (20 - 25 °C)

PH: 3 - 6 (20 - 25 °C)

Estabilidad en almacén: estable durante 2 años a partir de su elaboración, bajo condiciones normales de almacenamiento.

3. DESCRIPCIÓN:

RAFOGAN es un antiparasitario interno en suspensión oral de amplio espectro.

4. INDICACIONES:

RAFOGAN está indicado para el control y tratamiento de las formas adultas y juveniles de Fasciola Hepática, nemátodos gastrointestinales: *Ostertagia sp.* (incluidas las larvas inhibidas o hipobioticas), *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.*, *Chavertia ovina*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Trichuris spp.*, nemátodos pulmonares, *Dyctiocaulus spp.*, Las características de excreción por la mucosa anal le confiere la actividad contra las larvas de *Oestrus ovis*.

Tenias: *Moniezia spp.*, larvas de *Oestrus ovis* (gusano de la nariz). La combinación con cobalto y aminoácidos estimula la síntesis de B₁₂, mantiene las funciones orgánicas, previene anemias y mejora el nivel reproductivo. Tiene efecto energizante y estimula el apetito en el animal parasitado.

5. ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

6. DOSIS:

Tabla de dosificación:

P.V (Kg)	Dosis (mL)	Con 1 L de RafoGan puede dosificar la cantidad de animales
20	2,0	500
30	3,0	333
50	5,0	200
120	12,0	83
150	15,0	66
200	20,0	50
300	30,0	33
400	40,0	25

Administrar antes y después de las lluvias (como mínimo).

En ganado de engorde administrar antes del inicio de ciclo de engorde.

7. MODO DE ACCIÓN:

No se conoce con exactitud el modo de acción del rafoxanide, pero se sabe que interfiere con la formación de compuestos de alta energía como trifosfato y difosfato de adenosina y otros. Las características de excreción por la mucosa nasal le confiere actividad contra las larvas de *Oestrus ovis*.

El albendazole tiene poca solubilidad, por lo que permanece largos periodos en el intestino, a medida que se disuelve lentamente, tiene acción sobre larvas inmaduras y latentes, así como nematodos adultos, ya que mantiene concentraciones en plasma e intestino.

8. PRECAUCIONES:

En rumiantes se recomienda antes de la ingesta de las pasturas.

9. ADVERTENCIAS:

No utilizar en hembras preñadas durante los dos primeros meses de gestación.

10. PERIODO DE RETIRO:

Carne 28 días.

No administrar en animales en producción de leche para consumo humano. Trátense durante el período seco.

11. ALMACENAMIENTO:

Evite su transporte y almacenamiento junto a bebidas, alimentos y medicinas de uso humano o animal.

Guárdese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz y entre 5°C y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

12. PRESENTACIÓN:

Sachet de 40 mL

Frasco de 250 mL, 500 mL y 1L

Galonera.

13. FORMULADOR / DISTRIBUIDOR:

AGP SAC / VETEX PERU SAC

14. REG. SENASA:

F.008.002.N.01174