

FICHA TÉCNICA

Valiant

Pour On

USO VETERINARIO



1. GENERALIDADES:

Nombre Comercial: Valiant Pour On

Clase de uso: Tópico

Forma farmacéutica: Solución Transdérmica

Composición química:

Fluralaner	25 mg
Citronela	10 mg
Excipientes c.s.p.....	1 mL

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido denso.

Color: Amarillo.

Estabilidad en almacén: Estable durante 2 años a partir de su elaboración bajo condiciones normales de almacenamiento.

3. DESCRIPCIÓN:

Es una solución para aplicación transdérmica (Pour-On) a base de Fluralaner, posee una alta absorción y una larga efectividad contra ectoparásitos en ganado bovino.

4. INDICACIONES:

Valiant Pour On está indicado para el ganado bovino en el tratamiento de infestaciones por garrapatas de un solo huésped *Rhipicephalus microplus*, por moscas *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos) y por larvas de *Dermatobia hominis*. Su acción es inmediata.

5. ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos de carne.

6. PROPIEDADES:

Farmacodinámicas

Fluralaner es un acaricida e insecticida. Es eficaz contra varios ectoparásitos de bovinos. Fluralaner es un potente inhibidor de ciertas partes del sistema nervioso de los artrópodos, que actúa de forma antagónica sobre los canales de iones cloruro dependientes del ligando (receptor GABA y receptor de glutamato) y han demostrado una alta selectividad en el receptor GABA de mamíferos in vitro.

Además, pruebas in vitro confirmaron que fluralaner también es muy efectivo en géneros de *R. microplus* resistentes a compuestos antiparasitarios de uso común, incluidas lactonas macrocíclicas (ivermectina), fenilpirazol (fipronil), organofosforados, amidinas y piretroides sintéticos. Además del efecto acaricida que el fluralaner ha demostrado contra las garrapatas, también hay pruebas sólidas de una reducción de la fecundidad de las garrapatas, como indica la diferencia estadística observada en el peso de las

hembras de garrapata gestantes, la cantidad de huevos en el momento de la puesta y el porcentaje de eclosión de estos huevos.


Farmacocinéticas:

Fluralaner está altamente vinculado a las proteínas plasmáticas en el ganado. La absorción del producto no fue influenciada sustancialmente por altas o bajas temperaturas. Después de la administración transdérmica, el fluralaner se absorbe sistemáticamente y alcanza las concentraciones más altas en el hígado y la grasa, seguido por los riñones y los músculos de los bovinos.

7. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Es recomendada la administración del producto Valiant en el ganado, 1 mL de producto por cada 10 Kg de peso vivo.

Administrar el producto por vía transdérmica (pour-on), a lo largo de la línea media dorsal en contra del sentido del crecimiento del pelo, desde la base de la cola hasta la cruz. Para asegurar la administración de una dosis correcta, se debe determinar el peso corporal con la mayor precisión posible y se debe verificar la precisión del dispositivo dosificador antes de la administración.



Administración con botella de 1 L:

La cámara de dosificación de la botella está calibrada en mL. Siga las instrucciones de administración varias veces para familiarizarse con el funcionamiento del envase antes de administrarlo a los animales.


Paso 1: En el primer uso, retire la tapa y la lana de aluminio de la cámara de dosificación. No quite la tapa de la botella.



Paso 2: Mantenga la botella en posición vertical y al nivel de los ojos, presionar la zona inferior del frasco para llenar la cámara de dosificación hasta el nivel seleccionado.



Paso 3: Verter el volumen medido en la línea media dorsal del animal, extendiéndose desde la base de la cola hasta la cruz. Debe evitarse la aplicación ubicada en áreas más pequeñas.



8. CONTRAINDICACIONES:

No usar en caso de hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes.
No usar en vacas lactantes que produzcan leche para consumo humano.

9. REACCIONES ADVERSAS:

El tratamiento tópico con **Valiant Pour On** generalmente es bien tolerado, no se produjeron reacciones adversas graves en los estudios, en algunos animales se han observado reacciones locales leves y transitorias, que no afectan la salud general de los animales y no requieran un tratamiento específico.

Si se observan reacciones más graves u otras reacciones no descritas en este prospecto, se debe consultar al veterinario.

10. ADVERTENCIAS:

Aplicar el producto solo sobre la capa seca y evitar la exposición de los animales a la lluvia el día del tratamiento.

No se ha establecido la seguridad del producto en animales menores de 4 meses.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

- Aplicar el producto solo sobre la capa seca e intacta.
- Mantener a los animales tratados separados de los no tratados para evitar que se produzcan residuos en los animales no tratados.

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

- Se debe utilizar equipo de protección personal que consta de guantes, overoles y gafas de seguridad aprobados al manipular el producto.
- Evite el contacto con piel, ojos y membranas mucosas.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

- En caso de contacto con los ojos enjuague inmediatamente con agua.
- En caso de derrame accidental, quitar inmediatamente la ropa afectada y lavar la piel afectada con agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, enjuáguese inmediatamente la boca con abundante agua y busque atención médica.
- Evitar que los niños tengan acceso al producto o que estén en contacto con los animales tratados.
- No fumar, comer ni beber mientras manipula el producto.
- Lávese las manos después de su uso.

Gestación, lactancia y fertilidad:

- Se ha demostrado la seguridad del producto en vacas gestantes, demostrando que el producto puede utilizarse durante la gestación.
- No se han realizado estudios de seguridad en toros destinados a la reproducción, el uso en toros destinados a la cría debe hacerse sólo de acuerdo a una evaluación de riesgos y beneficios por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

- Ninguna conocida. En estudios clínicos de campo, no se observó interacción con tratamientos de rutina, como vacunación o suplementación con aditivos nutricionales.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antidotos):

- Ninguno conocido.

Incompatibilidades:

- En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C), protegido de la luz solar y fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

Una vez abierto el frasco, conservar el producto a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C) y utilizarlo en un plazo máximo de seis meses.

12. PERIODO DE RETIRO:

Carne: 42 días después de la aplicación.

Leche: Este producto no debe aplicarse a hembras productoras de leche para consumo humano.

13. PRESENTACIONES:

Frascos de 250 mL y 1 L.

14. FORMULADOR / DISTRIBUIDOR:

AGP SAC / VETEX PERU SAC

15. REG. SENASA:

F.087.033.N.00785